



Guia de Orientação ao Paciente Risperidona, Clozapina, Quetiapina, Ziprasidona, Olanzapina

Este é um guia sobre o medicamento que você está recebendo gratuitamente pelo SUS. Seguindo suas orientações você terá mais chances de se beneficiar com o tratamento. O medicamento é utilizado no tratamento do Transtorno Esquizofrênico.

1. ONDE GUARDAR O MEDICAMENTO

- Guarde o frasco protegido do calor, luz e umidade, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).
- Conserve os comprimidos na embalagem original;
- Mantenha o medicamento fora do alcance de crianças.

2. NA HORA DE TOMAR O MEDICAMENTO

- Para risperidona, clozapina, quetiapina, olanzapina: tome o comprimido com um copo de água, antes, durante ou após as refeições.
- Para ziprasidona: tome a cápsula junto às refeições.
- Siga os horários estabelecidos pelo seu médico.
- Em caso de esquecimento de uma dose, tome logo que possível. Se faltar pouco tempo para a próxima tomada, aguarde e tome somente a quantidade do próximo horário. **Não tome a dose dobrada.**

3. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS QUE PODEM SURTIR

- Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis,
- **RISPERIDONA:** febre, rigidez muscular, batimentos rápidos ou irregulares do coração, inquietação, fraqueza dos músculos, dificuldade de pôr-se em pé, movimentos involuntários da língua e maxilar, tontura, sonolência, ansiedade, problemas para dormir, visão turva, boca seca, nariz entupido, prisão de ventre, problemas para urinar, perda de desejo sexual ou impotência, ganho de peso.
- **CLOZAPINA:** sonolência, cansaço, tontura, boca seca ou salivação, aumento do suor, palpitação, prisão de ventre, enjôo, aumento de peso, dificuldade de urinar, dificuldade de enxergar e engolir, inquietação.
- **QUETIAPINA:** dor de cabeça, sonolência, batimentos rápidos ou irregulares do coração, inquietação, dificuldade de pôr-se em pé, tontura, cansaço, visão turva, dor de estômago, prisão de ventre, ganho de peso, tosse, falta de ar, alergias de pele.
- **ZAPRASIDONA:** sonolência, fraqueza, tontura, síndrome extrapiramidal, pressão baixa, prolongamento do intervalo QT e mais raramente convulsões.
- **OLANZAPINA:** dor de cabeça, sonolência ou insônia, agitação, nervosismo, tontura. Os menos comuns são visão turva, boca seca, prisão de ventre, ganho de peso, aumento de apetite, dificuldade para respirar, tremores, ansiedade, dores no corpo, mãos e pernas inchadas, mudanças no ciclo menstrual, alergias de pele e sintomas semelhantes aos da gripe.
- Informe seu médico sobre o aparecimento destes ou de outros efeitos desagradáveis.
- Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento, documento assinado por você e seu médico.

4. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento de seu médico ou orientação de um profissional de saúde. Pode ser perigoso à sua saúde.
- Comunique o médico se estiver em tratamento com outros medicamentos.

5. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO



• Para **clozapina**: a realização dos exames garante uma correta avaliação sobre o efeito que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos pode ser necessário ajustar a dose ou até suspender o tratamento.

6. PARA CONTINUAR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Evite dirigir ou operar máquinas, pelo menos no início do tratamento, até que a resposta do organismo ao medicamento seja conhecida.
- Quando estiver sentado ou deitado, procure não levantar rapidamente para evitar tonturas.
- Evite o uso de bebidas durante o tratamento.
- Em caso de gravidez, comunique ao médico imediatamente.
- Pacientes que farão uso da **risperidona**: se ficar muito tempo exposto ao sol e não estiver usando roupas que protegem o corpo, use protetor solar, pois a pele pode ficar mais sensível.
- Pacientes que farão uso da **quetiapina**: se ficar muito tempo exposto ao sol, tome bastante líquido para evitar desidratação ou conforme orientação médica.
- Pacientes que farão uso: da **olanzapina**: durante o tratamento tome bastante água, no mínimo 2 litros por dia, ou conforme orientação médica.

7. PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Retorne à farmácia a cada mês, com os seguintes documentos:
 - cartão de aprazamento
 - documento de identidade;
 - exames laboratoriais apenas para clozapina: hemograma e plaquetas .

8. EM CASO DE DÚVIDAS

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA.