



Guia de Orientação ao Paciente Acromegalia

Este é um guia sobre o medicamento que você está recebendo gratuitamente pelo SUS. Seguindo suas orientações, você terá mais chances de se beneficiar com o tratamento.

1. DOENÇA

- É uma doença que apresenta vários sinais e sintomas, tais como crescimento de mãos e pés, problemas com a visão, dores de cabeça, dores no corpo e juntas. Em jovens a doença também é conhecida como gigantismo.
- Podem ocorrer complicações com o aparecimento de outras doenças tais como aumento da pressão arterial, diabetes, doenças no coração, problemas no sono e problemas hormonais.

2. MEDICAMENTO

- Estes medicamentos aliviam os sintomas e melhoram a qualidade de vida.

3. GUARDA DO MEDICAMENTO

- Conserve os medicamentos na embalagem original, bem fechados.
- Mantenha o medicamento fora do alcance das crianças.
- **Octreotida e Lanreotida:** guarde o medicamento na geladeira e fora da caixa de isopor. Não guarde na porta da geladeira, nem no congelador ou freezer.
- **Cabergolina:** guarde o medicamento protegido do calor, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).

4. ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO

- Procure informações sobre todos os passos para a aplicação da lanreotida e octreotida com o médico ou profissional de enfermagem, bem como sua forma de preparo. Não aplique o medicamento até que esteja bem treinado.
- Procure informações com o farmacêutico de como descartar de forma adequada as seringas e agulhas após o uso.
- Tome exatamente a dose prescrita nos dias que o médico indicou, estabelecendo um mesmo horário.
- Em caso de esquecimento de uma dose, tome-a assim que lembrar. Não tome a dose em dobro para compensar a que foi esquecida.
- **Lanreotida:** deve ser aplicada por via subcutânea.
- **Octreotida:** deve ser aplicada por via intramuscular.
- **Cabergolina:** tome o comprimido sem mastigar, com água, de preferência junto às refeições.

5. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS

- Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis, tais como náuseas, vômitos, dor de cabeça, cansaço, diarreia, prisão de ventre, entre outras.
- Lanreotida e octreotida: podem causar reações no local da aplicação, tais como dor, vermelhidão, inchaço ou dureza.
- Se houver algum destes ou outros sinais/sintomas, comunique-se com o médico ou farmacêutico.

6. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou orientação de um profissional de saúde.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- A realização dos exames garante uma correta avaliação sobre o que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos pode ser necessário ajustar a dose ou até interromper o tratamento.

8. RENOVAÇÃO DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO



Governo do Estado da Bahia
Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde - SAFTEC
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB
Diretoria de Assistência Farmacêutica - DASF
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada - COAFE

- Converse com o farmacêutico do SUS para saber quais os documentos e exames são necessários para continuar recebendo os medicamentos.

9. EM CASO DE DÚVIDAS

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com o médico ou farmacêutico do SUS.

10. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA DO SUS.

PARA OCTREOTIDA E LANREOTIDA:

LEVAR CAIXA DE ISOPOR PARA TRANSPORTAR O MEDICAMENTO DA FARMÁCIA ATÉ SUA CASA E
GUARDÁ-LO IMEDIATAMENTE NA GELADEIRA.