



Guia de Orientação ao Paciente

BUDESONIDA - FENOTEROL - FORMOTEROL

ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO GRATUITAMENTE PELO SUS. SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCE DE SE BENEFICIAR COM O TRATAMENTO. O MEDICAMENTO É UTILIZADO NO TRATAMENTO DE **ASMA**.

1- DOENÇA

- Doença inflamatória crônica das vias aéreas que leva a crises de falta de ar, devido ao inchaço da mucosa brônquica, excesso de produção de muco e a contração da musculatura lisa das vias aéreas.
- Outros sintomas incluem tosse, dor e chiado no peito e dificuldade para respirar. Podem piorar à noite, ao acordar, durante o exercício, exposição a substâncias irritantes (como poeira ou cheiros fortes), mudanças climáticas e até mesmo risos e choro intensos.

2- MEDICAMENTO

- Estes medicamentos aliviam os sintomas e melhoram a qualidade de vida.

3-GUARDA DO MEDICAMENTO

- Guarde o medicamento protegido do calor, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).

4 -ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO

- Observe a apresentação e a dosagem do medicamento que você retirou no SUS. Algumas vezes podem vir 2 substâncias associadas no mesmo medicamento.
- Leia atentamente as instruções do dispositivo que você usará. Peça orientações ao médico ou farmacêutico quanto ao modo de usar. A correta utilização do medicamento é responsável pelo sucesso do tratamento.
- Alguns medicamentos vêm com cápsulas para inalação. Elas devem ser inaladas e não engolidas.
- Recomenda-se que, se você estiver fazendo uso de corticosteróides inalatórios, após cada inalação de medicamento, sejam feitos gargarejos com água sem engolir. Esta medida diminui os efeitos adversos em nível local.
- Em caso de esquecimento de uma dose, use a próxima dose assim que possível.
- Siga a orientação do seu médico, respeitando as doses, os horários e a duração do tratamento.

5- REAÇÕES DESAGRADÁVEIS

- Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis, tais como irritação na garganta, infecções na boca, náuseas, vômitos, aumento da frequência dos batimentos do coração, coceiras, dificuldade para dormir.
- Se houver algum destes ou outros sinais/sintomas, comunique-se com o médico ou farmacêutico.
- Maiores informações sobre reações adversas constam no Termo de Esclarecimento e Responsabilidade, documento assinado por você ou pelo responsável legal e pelo médico.

6 - USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou orientação de um profissional de saúde.

7- OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O uso de espaçadores acoplados aos aerossóis dosimetrados (bombinhas) faz com que o medi-

camento atue no local correto, diminuindo as chances de ocorrerem efeitos indesejáveis.

- Crianças com menos de 5 anos devem utilizar medicamentos através de nebulização, visto que ainda não têm coordenação para usar outro dispositivo.
- Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do médico.
- Em caso de gravidez, comunique ao médico imediatamente.
- A realização da espirometria garante uma correta avaliação sobre a evolução da doença. Em alguns casos, pode ser necessário alterar a dose do medicamento ou suspendê-lo.

8-PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Retorne à farmácia a cada mês, com os seguintes documentos:
 - Receita médica atual;
 - Cartão Nacional de Saúde ou RG;
 - Exames: A espirometria deve ser pelo menos 1 vez ao ano.

9 -EM CASO DE DÚVIDA

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com o médico ou farmacêutico do SUS.

10- OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA DO SUS.