



Guia de Orientação ao Paciente

Antiparkinsonianos

ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO GRATUITAMENTE PELO SUS. SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCES DE SE BENEFICIAR COM O TRATAMENTO. O MEDICAMENTO AGE NO SENTIDO DE DIMINUIR A EVOLUÇÃO DOS SINTOMAS DA **DOENÇA DE PARKINSON**.

1-ONDE GUARDAR O MEDICAMENTO

- Guarde o medicamento protegido do calor e da luz, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).
- Conserve os comprimidos na embalagem original.
- Mantenha o medicamento fora do alcance de crianças.

2- NA HORA DE TOMAR O MEDICAMENTO

- Tome logo após as refeições, para reduzir a irritação gastrointestinal.
- Tome o número exato de cápsulas prescrito por seu médico e procure seguir sempre o horário estabelecido.
- Em caso de esquecimento de uma dose, tome-a assim que lembrar. Se faltar pouco tempo para a próxima tomada, aguarde e tome somente a quantidade do próximo horário. **Não tome a dose dobrada.**

3- REAÇÕES DESAGRADÁVEIS QUE PODEM SURTIR

- Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis, tais como prisão de ventre, diarreia, dores de estômago, náuseas, vômitos, dor de cabeça, boca seca, perda de apetite, cansaço, sonolência, tonturas, pressão baixa, movimentos involuntários, alucinações, confusão, visão turva.
- Se sentir algum destes sintomas, não interrompa o tratamento, comunique ao médico.
- Se outros sintomas aparecerem, comunique-se com seu médico.
- Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento, documento assinado por você e seu médico.

4- USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou orientação de um profissional de saúde. Pode ser perigoso à sua saúde.

5- O USO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS

- Evite bebidas alcoólicas durante o tratamento (principalmente com a bromocriptina), pois reações desagradáveis podem ocorrer.

6- RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Quando estiver sentado ou deitado, procure não levantar rapidamente para evitar tonturas.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologias em Saúde
Diretoria de Assistência Farmacêutica
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada
Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso

- A retirada do medicamento do organismo deve ser feita de maneira gradual, sob orientação médica. Por isso, **não pare de tomar o medicamento sem o conhecimento de seu médico.**
- Sua urina pode ficar escura devido ao uso do medicamento.
- Evite dirigir ou operar máquinas que necessitem de atenção pelo menos no início do tratamento até que a resposta do organismo ao medicamento seja conhecida, pois o medicamento pode trazer tonturas e sonolência,
- Em caso de gravidez, comunique o fato imediatamente ao médico.

7- PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Retorne à farmácia em um mês, com os seguintes documentos:
 - receita médica
 - documento de identidade

8- EM CASO DE DÚVIDAS

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

9- OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA.