



Guia de Orientação ao Paciente

Clobazam, Gabapentina, Topiramato, Lamotrigina e Vigabatrina.

Este é um guia que contém orientações sobre sua doença e o medicamento que você está recebendo gratuitamente pelo SUS. Seguindo as orientações, você terá mais chance de se beneficiar com o tratamento.

1. DOENÇA

- É uma doença neurológica que leva a convulsões, com prejuízo da qualidade de vida como um todo. Pode afetar pessoas em qualquer idade, mas ocorre principalmente em crianças e idosos.

2. MEDICAMENTO

- Estes medicamentos evitam ou diminuem a frequência das crises convulsivas, com melhora significativa na qualidade de vida.

3. GUARDA DO MEDICAMENTO

- Conserve os medicamentos na embalagem original, bem fechados.
- Mantenha os medicamentos fora do alcance das crianças.
- Guarde o medicamento protegido do calor, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).

4. ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO

- Tome os comprimidos ou cápsulas sem mastigar ou abrir com ajuda de um líquido.
- Tome exatamente a dose que o médico indicou, estabelecendo um mesmo horário todos os dias.
- Para xaropes, soluções e suspensões orais utilizar um medidor de volume para tomar exatamente a quantidade prescrita. Os frascos das suspensões devem ser agitados antes de tomar.
- Em caso de esquecimento de uma dose tome assim que lembrar. Não tome a dose dobrada para compensar a que foi esquecida.
- Tanto faz tomar o medicamento antes ou depois das refeições.

5. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS

- Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis, tais como sonolência, sedação, tonturas, dor de cabeça, cansaço, entre outros.
- Se houver algum destes ou outros sinais/sintomas, comunique-se com seu médico ou farmacêutico.
- Maiores informações sobre reações adversas constam no Termo de Esclarecimento e Responsabilidade, documento assinado por você ou pelo responsável legal e pelo médico.

6. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou orientação de um profissional de saúde.

7. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE LABORATÓRIO

- A realização dos exames garante uma correta avaliação sobre o que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos pode ser necessário ajustar a dose ou até interromper o tratamento.

8. RENOVAÇÃO DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO

- Converse com o farmacêutico do SUS para saber quais os documentos e exames são necessários para continuar recebendo os medicamentos.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O tratamento só deve ser interrompido sob orientação médica. A parada repentina pode causar reações desagradáveis ou reaparecimento das convulsões.
- O uso de bebidas alcoólicas pode levar a um aumento das reações desagradáveis, como tonturas e sonolência.
- Evite dirigir ou operar máquinas, pelo menos no início do tratamento, pois podem ocorrer tonturas, sonolência e visão borrada.
- Para mulheres em uso de topiramato: ação da pílula anticoncepcional pode ficar reduzida. Procure orientação de um ginecologista para uso de outros métodos para evitar a gravidez., Clobazam,: este medicamento é totalmente contraindicados na gestação e podem causar sérios problemas ao feto. Antes do início do tratamento com esses medicamentos, procure orientação para o uso de métodos contraceptivos adequados. Converse com o médico a respeito. Caso engravide, comunique imediatamente ao médico.
- Pacientes diabéticos devem monitorar com mais frequência a glicemia.
- Pacientes com insuficiência renal em uso de topiramato devem ter as doses ajustadas pela metade.

10. EM CASO DE DÚVIDAS

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO, DEVOLVA-O À FARMÁCIA DO SUS.