

Boletim Epidemiológico

Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Bahia, 2020

Nº 10, Julho, Ano 2020

Sumário

Apresentação1

Análise Epidemiológica2

Perfil epidemiológico dos casos de SRAG hospitalizados na Bahia2

Perfil epidemiológico e sócio demográfico dos casos de COVID- 19 hospitalizados, notificados no SIVEP- GRIPE4

APRESENTAÇÃO

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica vem atualizando, periodicamente, os dados de Síndrome Respiratória Aguda e Grave (SRAG) na Bahia, com o intuito de favorecer o conhecimento oportuno do perfil sócio demográfico e epidemiológico de doenças respiratórias agudas e virais com potencial epidêmico, mais incidentes no estado, a exemplo da influenza, COVID-19, entre outras viroses.

O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG é o SIVEP GRIPE (<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>). As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) das unidades hospitalares das redes pública e privada, conforme o fluxo municipal. Ressalta-se que face à pandemia pelo novo coronavírus, os casos de Síndrome Gripal devem ser notificados no sistema e-SUS-VE.

DEFINIÇÃO DE CASO SRAG

CASO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG-HOSPITALIZADO)

Indivíduo com SG* que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

*SG: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.

ATENÇÃO:

- ✓ Digitar no SIVEP-Gripe e anotar o número da ficha de registro individual antes de encaminhá-la junto com a amostra, para o laboratório;
- ✓ Lembrar-se de atualizar os dados da conclusão do caso (classificação final, critério de confirmação/descarte, evolução do caso, data da alta/óbito e data de encerramento) depois de recebido o resultado laboratorial.

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Perfil epidemiológico dos casos de SRAG hospitalizados na Bahia

Na Bahia, até a semana epidemiológica (SE) nº31 de 2020 (28.07.2020), foram notificados 16.835 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados, representando aumento de 1.134% em relação ao mesmo período de 2019 (1.364). Desse total de casos, 234 foram confirmados para Influenza (1,4%), 8.391 para COVID-19 (49,8%), 76 para outros vírus respiratórios (0,5%), 115 para outros agentes etiológicos (0,7%) e 4.677 casos foram classificados como SRAG não especificada (27,8%). Ressalta-se que 3.342 casos (19,9%) permanecem em investigação.

Foram registrados 5.139 óbitos por SRAG em 2020, representando um aumento de 4.748% em relação ao ano anterior (106), sendo 19 (0,4%) ocasionados pelo vírus Influenza, 3.519 (68,5%) por SARS CoV-2 (COVID-19), 13 (0,3%) por outros vírus respiratórios e 40 (0,8%) por outros agentes etiológicos. Não houve identificação de vírus respiratórios para 1.413 (27,5%) casos que evoluíram para óbito. Do total de óbitos notificados, 135 (2,6%) estão em investigação. Observa-se, ainda, que do total de casos notificados, 6.508 casos estão sem registro de evolução (Tabela1).

Tabela 1. Classificação final dos casos SRAG hospitalizados segundo a classificação final. Bahia, 2020.


Classificação Final	Evolução em Branco ou Ignorada		Cura		Óbito		Total de casos	
	n	%	n	%	n	%	n	%
COVID-19	2022	31,1	2850	54,9	3519	68,5	8391	49,8
SRAG por Influenza	56	0,9	159	3,1	19	0,4	234	1,4
SRAG por outro vírus respiratório	24	0,4	39	0,8	13	0,3	76	0,5
SRAG por outro agente etiológico	42	0,6	33	0,6	40	0,8	115	0,7
SRAG não especificado	1215	18,7	2049	39,5	1413	27,5	4677	27,8
Em Branco/Em investigação	3149	48,4	58	1,1	135	2,6	3342	19,9
Total	6508	100,0	5188	100,0	5139	100,0	16835	100,0

Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31.

Analisando a distribuição de casos SRAG hospitalizados por semana epidemiológica segundo a classificação final (Figura 1), verifica-se que houve aumento de casos de Influenza a partir da SE 08 e identificação do primeiro caso hospitalizado para COVID-19 na SE 10. A partir da semana 15 observou-se a redução dos casos por influenza. Os dados estão em constante atualização, o que pode alterar o perfil epidemiológico analisado, à medida que as notificações são encerradas no SIVEP GRIPE. Destaca-se que os casos de SRAG não especificados correspondem àqueles que

tiveram resultados laboratoriais negativos ou inconclusivos, ou ainda os casos para os quais não foi realizada coleta de exames laboratoriais. Nota-se que os casos de SRAG não especificada se mantêm elevado ao longo do período em análise.


Figura 1. Distribuição dos casos de SRAG segundo classificação final e status de investigação. Bahia, 2020*.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31

Na análise dos casos de Influenza, verificou-se o predomínio da circulação do vírus Influenza AH1N1 (69%), seguido pelo vírus Influenza B (17,3%). Figura 2.

Figura 2. Distribuição percentual dos casos de Influenza segundo subtipo viral. Bahia, 2020*.




Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31

Perfil epidemiológico e sócio demográfico dos casos de Covid 19 hospitalizados, notificados no SIVEP-GRIPE

Observou-se o aumento de casos de COVID-19 hospitalizados que tiveram início dos sintomas a partir da semana 10, quando foram registrados 06 casos e 3 óbitos. O pico máximo de casos e óbitos ocorreu na semana epidemiológica nº 23, quando foram registrados 801 casos confirmados e 348 óbitos nestas semanas. A curva de casos e óbitos manteve um platô entre as semanas epidemiológicas nº 20 a 25. Apesar da aparente tendência de redução de casos e óbitos a partir da SE nº 26 (Figura 3), esses dados não podem ser considerados para implementação das ações de controle da pandemia, pois há um expressivo número de casos que ainda estão em investigação para encerramento.

Figura 3. Distribuição do número de casos hospitalizados e óbitos por COVID-19, segundo a semana epidemiológica de início dos sintomas. Bahia, 2020*.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31

A tabela 2 mostra o coeficiente de incidência e o coeficiente de mortalidade dos casos de SRAG por COVID-19, segundo faixa etária na Bahia. O número total de casos registrados é de 8.391, com coeficiente de incidência (CI) de 56,4 casos/100 mil habitantes. O total de óbitos registrados no SIVEP-Gripe é de 3.519 e o coeficiente de mortalidade é de 0,6/1.000 habitantes. Observa-se maior CI entre os casos com idade igual ou maior de 80 anos (593/100 mil hab). O coeficiente de incidência é menor entre os casos com faixa etária de 10 a 14 anos (1,7/100 mil hab), seguidos por casos de 5 a 9 anos (2,5/100 mil hab) e de 1 a 4 anos (3,5/ 100 mil hab). Os casos que

apresentam maior coeficiente de mortalidade estão na faixa etária igual ou maior a 80 anos (5,9/1.000 hab.). A segunda maior taxa de mortalidade é observada na faixa etária de 70 a 79 anos (3,4/1.000 hab.).


Tabela 2. Coeficiente de incidência (por 100.000 habitantes) e coeficiente de mortalidade (por 1.000 habitantes) dos casos de SRAG hospitalizados por COVID-19, segundo faixa etária. Bahia, 2020*.

Faixa Etária	Casos	Incidência	Óbitos	coeficiente de mortalidade /1000 hab
< 1 ano	71	32,1	10	0,3
1 a 4 anos	32	3,5	2	0,0
5 a 9 anos	32	2,5	3	0,0
10 a 14 anos	24	1,7	2	0,0
15 a 19 anos	51	3,6	12	0,0
20 a 29 anos	243	8,7	42	0,1
30 a 39 anos	742	32,3	146	0,3
40 a 49 anos	1075	60,1	263	0,6
50 a 59 anos	1335	105,4	458	1,1
60 a 69 anos	1737	212,0	807	2,1
70 a 79 anos	1559	335,2	825	3,4
80 anos e+	1490	593,0	949	5,9
Total	8391	56,4	3519	0,6

Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31

Na avaliação do critério raça/cor, observou-se que 40,2% dos casos não tiveram essa informação preenchida na ficha do SIVEP-GRIPE, comprometendo a avaliação dessa variável. Dentre os casos com essa informação, verificou-se o predomínio de 44,6% da ocorrência de casos entre pardos, seguida da raça branca, com 7,1% e negra com 7,0%.


Figura 4. Distribuição percentual dos casos de SRAG por COVID-19 segundo o critério raça/cor. Bahia, 2020*.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB - *Dados preliminares até semana epidemiológica 31

De acordo com a análise segundo o sexo (Figura 5), foi registrado o maior número de casos (4.662) no sexo masculino, correspondendo a 55,6% do total de casos. Para o sexo feminino foram registrados 3.728 casos (44,4%).


Figura 5. Distribuição percentual dos casos de SRAG por COVID-19 segundo o sexo. Bahia, 2020*.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31.

Na avaliação do encerramento de casos confirmados para COVID-19 no SIVEP GRIPE, verificou-se que 94,3% dos casos foram encerrados por critério laboratorial, 0,8% por critério clínico, 0,3% por vínculo epidemiológico e para 4,5% não foi informado o critério de encerramento. (Figura 6).


Figura 6. Critérios de encerramento de casos COVID-19 no SIVEP GRIPE.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31

Analisando a distribuição espacial dos casos hospitalizados por COVID-19 no estado (Figura 7), segundo município de residência, nota-se que Salvador concentrou 56,1% dos casos hospitalizados (4.708). Destacam-se também os municípios de Ilhéus com 224 casos e Simões Filho (200), seguido por Lauro de Freitas (190) e Itabuna (160) (Figura 7).

Figura 7. Distribuição espacial dos casos de SRAG por Covid-19, Bahia, 2020*.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31.

Verifica-se, na Tabela 3, que o Núcleo Leste apresentou a maior incidência de SRAG por COVID-19 (123,8/100 mil hab), seguido pelos Núcleo Sul (54,9/100.000 hab), dessa forma o maior risco de adoecimento por COVID-19 está atribuído aos municípios de abrangência desses Núcleos Regionais de Saúde. Em relação aos óbitos, destaca-se o Núcleo Leste (2.341 óbitos) com Coeficiente de Mortalidade de 0,49/1.000 hab. Esses dados estão em constante atualização e podem ser alterados em função da inserção e do encerramento de casos no SIVEP GRIPE.


Tabela 3. Coeficiente de incidência (por 100.000 habitantes) e coeficiente de mortalidade (por 1.000 habitantes) dos casos de SRAG por COVID-19, segundo Núcleo Regional de Saúde. Bahia, 2020*.

Núcleo Regional de notificação	casos	%	incidência /100 mil hab	óbito	Coefficiente de mortalidade /1000 hab
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE CENTRO NORTE	60	1,3	2,7	38	0,02
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE CENTRO-LESTE	362	7,8	43,8	177	0,21
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EXTREMO SUL	303	6,5	36,4	158	0,19
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE LESTE	5898	127,3	123,8	2341	0,49
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NORDESTE	147	3,2	13,4	54	0,05
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NORTE	202	4,4	23,1	87	0,10
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE OESTE	80	1,7	8,3	29	0,03
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	410	8,8	22,6	107	0,06
NUCLEO REGIONAL DE SAUDE SUL	929	20,1	54,9	528	0,31
Total	8391	181,1	55,5	3519	0,23

Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31.

Dentre os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes hospitalizados por COVID-19 destacam-se a tosse (67,8%), febre (65,9%), desconforto respiratório (64,4%) e dispnéia (57%) (Figura 8).


Figura 8. Frequência de sinais e sintomas entre os casos SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19. Bahia, 2020*.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31.

Dentre as comorbidades apresentadas, destacam-se a Doença Cardiovascular (37,1%) e Diabetes (30,5%). Registrou-se 33,8% de outros fatores de risco entre os casos confirmados de Covid-19 que não estão especificados na ficha no SIVEP GRIPE. (Figura 9).

Figura 9. Distribuição proporcional dos casos SRAG hospitalizados confirmados para COVID-19, segundo fatores de risco para agravamento. Bahia, 2020*.



Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB *Dados preliminares até semana epidemiológica 31

EDITORIAL

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Coordenação de Imunizações e Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis

Grupo Técnico de Influenza

Diagramação e Projeto Gráfico

Aline Anne Ferreira

(71) 3116.0042 / divep.influenza@saude.ba.gov.br

Responsáveis pela Edição: Marcia São Pedro Leal Souza (Diretora DIVEP) e Vânia Rebouças Barbosa Vanden Broucke (Coordenadora CIVED).

Elaboração: Aline Anne Ferreira, Amanda dos S. Nascimento, e Ada Antonelli Tittoni

Colaboração: Gabriel Alves Costa, Amanda Libiene Costa, Andréa Uiara, Moacir Santana Filho, Ramon Saavedra, Edson Ribeiro, Luciana Guimarães, Maria Raquel A. Soares e Vânia Leão.

Revisão: Adriana Dourado de Carvalho e Vânia Rebouças B. Vanden Broucke