



## TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE - Endometriose GOSSERRELINA, LEUPRORRELINA, TRIPTORRELINA E DANAZOL.

Eu, \_\_\_\_\_ (nome do paciente), declaro ter sido informada claramente sobre os benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso do(s) medicamento(s) gosserrrelina, leuprorrelina, triptorrelina e danazol, indicados para o tratamento da endometriose. Os termos médicos me foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico \_\_\_\_\_ (nome do médico que prescreve). Assim declaro que fui claramente informada de que o medicamento que passo a receber pode trazer os seguintes benefícios:

- ⌚ Diminuição da dor;
  - ⌚ Redução dos nódulos endometrióticos. Fui também claramente informada a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos colaterais e riscos:
    - ⌚ Medicamentos contraindicados em gestantes ou em mulheres planejando engravidar;
    - ⌚ Medicamentos contraindicados em mulheres que estão amamentando (lactantes);
    - ⌚ Os efeitos colaterais já relatados são:
      - ⌚ Gosserrrelina: frequentes – calorões, distúrbios menstruais; menos frequentes – visão borrada, diminuição da libido, cansaço, dor de cabeça, náusea, vômitos, dificuldade para dormir, ganho de peso, vaginite; raros – angina ou infarto do miocárdio, tromboflebitas.
      - ⌚ Leuprorrelina: frequentes – calorões, diarreia, distúrbios menstruais; menos frequentes – arritmias cardíacas, palpitações; raros – boca seca, sede, alterações do apetite, ansiedade, náusea, vômitos, desordens de personalidade, desordens da memória, diminuição da libido, ganho de peso, dificuldades para dormir, delírios, dor no corpo, perda de cabelo e distúrbios oftalmológicos.
      - ⌚ Triptorrelina: frequentes – calorões, dores nos ossos, impotência, dor no local da injeção, hipertensão, dores de cabeça; menos frequentes – dores nas pernas, fadiga, vômitos, insônia; raros – tonturas, diarreia, retenção urinária, infecção do trato urinário, anemia, prurido.
      - ⌚ Danazol: frequentes – distúrbios da menstruação, ganho de peso, calorões; menos frequentes – inchaço, escurecimento da urina, cansaço, sonolência, acne, aumento da oleosidade do cabelo e pele, perda de cabelo, alteração da voz, crescimento do clitóris ou atrofia testicular; raros – adenoma, catarata, eosinofilia, disfunção hepática, pancreatite, hipertensão intracraniana manifestada por dor de cabeça, náusea e vômitos, leucocitose, pancreatite, rash cutâneo, síndrome de Stevens-Johnson, trombocitopenia, fotossensibilidade. - medicamentos contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos fármacos;
      - ⌚ O risco de ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.
- Estou ciente de que esse(s) medicamento(s) somente pode(m) ser utilizado(s) por mim, comprometendo-me a devolvê-lo(s) caso não queira ou não possa utilizá-lo(s) ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser assistida, inclusive se desistir de usar o medicamento.
- Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazer uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato. ( ) Sim ( ) Não
- O meu tratamento constará do seguinte medicamento:

( ) Gosserrrelina ( ) Leuprorrelina ( ) Triptorrelina ( ) Danazol

Local/Serviço: _____		Data: ____/____/____	
Nome do paciente: _____		Cartão Nacional de Saúde: _____	
Nome do responsável legal: _____		ident. do responsável legal: _____	
_____ Assinatura do paciente ou do responsável legal			
Médico Responsável: _____	CRM: _____	UF: _____	
_____ Assinatura e carimbo do médico			

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.