



FORMULÁRIO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO DE ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA

Data do Atendimento: ___ / ___ / ___

Nome do Paciente: _____	Idade: _____
Serviço: _____	Cidade: _____
Médico Responsável: _____	CRM: _____ UF: _____
CID-10: () N18.0 ou () N18.8	

Medicamento Solicitado: _____

POR DEFICIÊNCIA DE ALFAEPOETINA PORTARIA SAS/MS N° 365 DE 15/02/2017

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+3 + (4 ou 5), assinar abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (taxa de filtração glomerular estimada (TFG) < 60 mL/min por 1,73 m²).
- () 2. Anemia com Hemoglobina ≤ 10 g/dL (adultos) ou < 11 g/dL (pacientes pediátricos até 18 anos).
- () 3. Índice de Saturação da Transferrina (IST) > 20 %.
- () 4. Hemodiálise com Ferritina > 200 ng/mL.
- () 5. Tratamento Conservador ou Diálise Peritoneal com Ferritina > 100 ng/mL.

Anexar: Creatinina (validade: semestral); Hemoglobina (validade: mensal); Ferritina (validade: trimestral); Índice de Saturação da Transferrina (IST) (validade: trimestral).

POR DEFICIÊNCIA DE SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO - PORTARIA SAS/MS N° 365 DE 15/02/2017

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+(3 ou 4 ou 5 ou 6) conforme assinalado abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (taxa de filtração glomerular estimada (TFG) <60 mL/min por 1,73m²). ()
- () 2. Anemia com hemoglobina <10 g/dL.
- () 3. Tratamento conservador ou diálise peritoneal com ferritina <100 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência absoluta).
- () 4. Tratamento conservador ou diálise peritoneal com ferritina entre 100 e 500 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência relativa).
- () 5. Hemodiálise com ferritina <200 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência absoluta).
- () 6. Hemodiálise com ferritina entre 200 e 500 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20% (deficiência relativa)

Anexar: Creatinina (validade: semestral); hemoglobina (validade: mensal); ferritina (validade: trimestral); índice de saturação da transferrina (IST) - (calculável pelo ferro sérico e pela capacidade total de ligação do ferro - validade: trimestral).

PACIENTES PEDIÁTRICOS ATÉ 18 ANOS

Diagnóstico de doença renal crônica (DRC) e as condições 1+2+3, conforme assinalado abaixo:

- () 1. DRC nos estágios 3-5 (TFG <60 mL/min por 1,73m²).
- () 2. Anemia com hemoglobina <10 g/dL.
- () 3. Ferritina <200 ng/mL e índice de saturação da transferrina (IST) <20%.

Anexar: Creatinina (semestral); hemoglobina (mensal); ferritina (trimestral); IST (trimestral).

Declaro para fins de solicitação dos medicamentos Alfaepoetina e ou Sacarato de Hidróxido Férrico para o tratamento de Anemia na Doença Renal Crônica, que o (a) paciente não apresenta nenhum critério de exclusão para uso do ou do(s) medicamento(s) indicado(s).

Assinatura e carimbo do(a) médico(a)