

Formulário de acesso para os medicamentos Síndrome Nefrótica Primária em Adultos
PORTARIA CONJUNTA Nº 8, DE 14 DE ABRIL DE 2020

Nome do Paciente: _____ Data do Atendimento: ____/____/____

Médico Responsável: _____ CRM: _____ UF: ____

1. Diagnóstico:

() Tratamento inicial () Recidivas esporádicas () Corticodependente ou de recidivas frequentes

2. Selecionar, dentre os critérios listados, aqueles que o paciente apresenta:

() Síndrome nefrótica definida pela presença de proteinúria ($>3,0-3,5 \text{ g}/1,73\text{m}^2/\text{dia}$ em adultos), hipoalbuminemia ($<3,0 \text{ g/dl}$) e edema, frequentemente de hiperlipidemia, hipercoagulabilidade e outras alterações clínico-laboratoriais (**anexar hemograma**)

() Diagnóstico histopatológico de material obtido por biopsia renal referentes aos diagnósticos especificados no PCDT (**anexar biopsia renal**)

() Presença de proteinúria nefrótica ($>3,0-3,5 \text{ g}/1,73\text{m}^2$ de superfície corporal/dia), mesmo sem o quadro completo de síndrome nefrótica, sem diagnóstico histopatológico (**anexar hemograma**)

() Pacientes com síndrome nefrótica primária nos quais a contraindicação para realização de biopsia renal seja absoluta (**anexar relatório médico com justificativa**)

3. Selecionar, dentre os itens listados, aqueles que o paciente apresenta:

() Neoplasia maligna em atividade (de pulmão, pele – exceto carcinoma de células escamosas, mama e cólon, entre outras)

() Creatinina sérica superior a $3,5\text{mg/dl}$, com doença renal crônica estágio 4 (taxa de filtração glomerular entre 15 e $29 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2 \text{ SC}$) ou estágio 5 (taxa de filtração glomerular $< 15 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2 \text{ SC}$), com ou sem evidência de rins diminuídos ou contraídos ($< 9 \text{ cm}$)

() Contraindicações específicas para uso de ciclofosfamida: contagem de leucócitos $<3.000/\text{mm}^3$, contagem de neutrófilos $<1.500/\text{mm}^3$ e contagem de plaquetas $<50.000/\text{mm}^3$

() Condições ou doenças sistêmicas subjacentes, como diabetes melito, hepatites virais, soro positividade para HIV, sífilis e colagenoses como lúpus eritematoso sistêmico, crioglobulinemia e vasculites sistêmicas anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA) positivas (poliangeíte com granulomatose, poliangeíte microscópica)

Assinatura e carimbo do médico