

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologias em Saúde(SAFTEC)
Diretoria de Assistência Farmacêutica (DASF)
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada (COAFE)

FORMULÁRIO DE ACESSO À IMUNOGLOBULINA PARA SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ
PORTARIA CONJUNTA Nº 15, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.

Nome do Paciente: _____	
Peso _____	Idade: _____ Sexo: M () F () Data do Atendimento: ____/____/____
Médico Responsável _____	CRM: _____ UF _____

Dados Clínicos (Todos os itens deverão ser preenchidos pelo médico assistente)
Classificação Estatística da Doença CID-10 G61.0

- Síndrome de Guillain-Barré

1. Quando começou os primeiros sintomas da doença no paciente?

Especificar: _____

2. Qual a condição do(a) paciente na escala de gravidade clínica proposta por Hughes et al?
Marcar com um X.

☐	0	Saudável
☐	1	Sinais e sintomas menores de neuropatia, mas capaz de realizar tarefas manuais
☐	2	Apto a caminhar sem auxílio da bengala, mas incapaz de realizar tarefas manuais
☐	3	Capaz de caminhar somente com bengala ou suporte
☐	4	Confinado a cama ou cadeira de rodas
☐	5	Necessita de ventilação assistida
☐	6	Morte

3. Critérios Diagnósticos: propostos para a definição clara do diagnóstico de SGB:

3.1.Critérios Essenciais:

Paciente apresenta TODOS os critérios abaixo?

SIM () NÃO ()

- a) Fraqueza progressiva de mais de um membro ou de músculos cranianos de graus variáveis, desde paresia leve até plegia;
b) Hiporreflexia e arreflexia distal com graus variáveis de hiporreflexia proximal.

**Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologias em Saúde(SAFTEC)
Diretoria de Assistência Farmacêutica (DASF)
Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada (COAFE)**

3.2.Critérios sugestivos da SGB Clínicos:

Quais dos Critérios Clínicos sugestivos da SGB o paciente apresenta? Assinale com um X.

- ☐ Progressão dos sintomas ao longo de 4 semanas;
- ☐ Demonstração de relativa simetria da paresia de membros;
- ☐ Sinais sensitivos leves a moderados;
- ☐ Acometimento de nervos cranianos, especialmente expresso por fraqueza bilateral dos músculos faciais;
- ☐ Dor;
- ☐ Disfunção autonômica;
- ☐ Ausência de febre no início do quadro.

3.3 Critérios que reduzem a possibilidade da SGB:

**O paciente apresenta alguma das situações abaixo? SIM () NÃO ()
Em caso afirmativo assinale com um X ?**

- ☐ Fraqueza assimétrica;
- ☐ Disfunção intestinal e de bexiga no início do quadro;
- ☐ Ausência de resolução de sintomas intestinais ou urinários;
- ☐ presença de mais de 50 células/mm³ na análise do LCR
- ☐ presença de células polimorfonucleares no LCR;
- ☐ nível sensitivo bem demarcado.

3.4. Critérios que excluem a possibilidade da SGB:

**O paciente apresenta alguma das situações abaixo? SIM () NÃO ()
Em caso afirmativo assinale com um X?**

- ☐ História de exposição a hexacarbono, presente em solventes, tintas, pesticidas ou metais pesados;
- ☐ Achados sugestivos de metabolismo anormal da porfirina;
- ☐ História recente de difteria;
- ☐ Suspeita de intoxicação por chumbo (ou outros metais pesados).
- ☐ Síndrome sensitiva pura (ausência de sinais motores).
- ☐ Diagnóstico de botulismo, miastenia gravis, poliomielite, neuropatia tóxica, paralisia periódica ou paralisia conversiva.
- ☐ Pacientes apresenta mais de 8 semanas de evolução da doença;
- ☐ Pacientes com insuficiência renal
- ☐ Pacientes com contraindicações ou efeitos adversos não toleráveis à IgIV.

4. Análise do LCR:

- ☐ Alta concentração de proteína;
- ☐ Presença de menos de 10 células/mm³ .

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Assinatura e carimbo do médico