



ORIENTAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DA QUIMIOPROFILAXIA COM RIFAMPICINA
DOENÇA MENINGOCÓCICA

MODO DE USAR	MÉDIA DE PESO POR FAIXA ETÁRIA									
Dose a cada 12h durante 02 dias	6 a 11m (+ / - 10kg)	1 a 2 anos (10 a <12,5kg)	2 a 3 anos (+ / - 15kg)	3 a 5 anos (+ / -17kg)	5 a 6 anos (18 a 23 kg)	7 a 8 anos (24 a 28kg)	9 a 10 anos (29 a 32kg)	11 a 12 anos (33 a 38kg)	13 a 14 anos (39 a 45kg)	> 15 anos
	(100mg)	(125mg)	(150mg)	(170mg)	(200mg)	(250mg)	(300mg)	(350mg)	(400mg)	(600mg)
	5 ml	6 ml	7,5 ml	8,5 ml	10 ml	12,5 ml	15 ml	17,5 ml	20 ml	2 cápsulas

OBSERVAÇÕES:

RIFAMPICINA

1 Medida equivale a 7,5 ml
7,5 ml equivale a 150mg
1 cápsula equivale a 300 mg
15 ml equivale a 1 cápsula (300mg)

DOSE A SER ADMINISTRADA EM:

Adultos 600 mg/dose de 12/12 horas, durante 2 dias consecutivos
1 mês a 10 anos 10 mg/kg/dose de 12/12 horas, durante 2 dias consecutivos - dose máxima de 600mg/kg/dose
Menor de 1 mês 5 mg/kg/dose de 12/12 horas, durante 2 dias consecutivos

RECOMENDAÇÕES:

- Usar a RIFAMPICINA em mulheres amamentando e recém-nascidos.
- Evitar o uso do medicamento após as refeições.
- Durante os dias de uso da medicação, não ingerir bebidas alcoólicas.

INDICAÇÕES:

- Uso exclusivamente para contatos próximos do doente (moradores do mesmo domicílio, pessoas que compartilham o mesmo dormitório em alojamentos, quartéis, etc.);
- exposição próxima e contínua de pelo menos 4 horas em ambiente fechado (creches e escolas, ambiente de trabalho, entre outros) e pessoas diretamente expostas às secreções do paciente.

CONTRA INDICAÇÕES:

- Não deve ser usado por pessoas com icterícia ou com história de hipersensibilidade à Rifampicina.
- Não recomendado para gestantes.

A QUIMIOPROFILAXIA DEVE SER INSTITUÍDA O MAIS PRECOCAMENTE POSSÍVEL - PRAZO IDEAL 24 HORAS, PRAZO MÁXIMO ATÉ 10 DIAS.

Elaboração: Diretoria de Vigilância Epidemiológica/ **GT-MENINGITES**

1ª Diretoria Regional de Saúde
Hospital Couto Maia